

Zalecenia po zabiegu chirurgicznym:

1. Zimny okład „operowanej” okolicy 3-4 razy po 30 minut.
2. Utrzymywać tampon w ustach przez 30 min po zabiegu. Po 30 min proszę usunąć tampon.
3. NIE spożywać pokarmów, nie pić , nie płukać jamy ustnej, a także NIE palić papierosów, przez pierwsze 3 godziny po zabiegu.
4. Od następnego dnia po zabiegu należy dbać o higienę jamy ustnej: szczotkować zęby miękką szczoteczką oraz stosować płyny antyseptyczne np. Eludril, Corsodyl.
5. Jeżeli zalecono leki to proszę stosować zgodnie z zaleceniami:
 - Augumentin / Amoksiklav 1.0 (co 12 godzin do końca opakowania)
 - Clindamycin MIP 0.6 (co 12 godzin do końca opakowania)
 - Ketonal Forte 0.1 lub Aulin (co 12 godzin do końca opakowania)
 - Ibuprom lub Nurofen (co 4-8 godzin przeciwbólowo)
6. W razie wystąpienia objawów niepokojących takich jak: obrzęk znacznych rozmiarów, silne dolegliwości bólowe nie ustępujące po lekach przeciwbólowych, krwawienie z jamy zabiegowej, objawów ogólnych, proszę o kontakt pod nr tel. 77 402 18 20
7. Jeżeli zostały założone szwy to należy się zgłosić w ustalonym terminie na ich usunięcie (zazwyczaj w ciągu 7-10 dni po zabiegu).